



**Todos  
merecemos vivir,  
y todos podemos  
ser un amigo  
de por vida.**

**MANTEN  
SEGUROS A  
TUS AMIGOS.  
PORTA  
NALOXONA  
(NARCAN).**



**Ve más información en  
[WAFriendsForLife.com/es](https://WAFriendsForLife.com/es)**

**La mayoría de las muertes por  
sobredosis en Washington  
involucran fentanilo.**

**La naloxona revierte las  
sobredosis de opioides,  
incluso de fentanilo.**

## DATOS SOBRE EL FENTANILO

**Fuerte. Impredecible. Peligroso.**

- El fentanilo es un potente opioide sintético de acción rápida, así que las sobredosis ocurren con rapidez.
- No te puedes dar cuenta de que has tomado fentanilo que se añadió a pastillas, cocaína, MDMA o heroína.
- Una pastilla, línea o "toque" puede causar una sobredosis mortal.

## APRENDE ACERCA DE LA NALOXONA

**Segura. Simple Legal.**

- La naloxona es un medicamento que revierte las sobredosis de opioides.
- Cualquier persona puede obtener, portar y usar naloxona – no necesita entrenamiento especial.
- Está disponible de manera gratuita en muchas comunidades, o puedes comprarla en una farmacia.
- Washington tiene una orden permanente que sirve como receta médica, por lo que no se necesita receta.
- No forma hábito y no puede causarle daño a nadie, incluso si no consumió opioides.

## TU AMIGO PUEDE TENER UNA SOBREDOSIS SI:

- No puede despertar.
- No está respirando cada 3 a 5 segundos.
- Se está poniendo azul, gris o morado, o su piel se siente fría.

Si crees que tu amigo tiene una sobredosis, llama al 911. Después adminístrale naloxona y respiración de rescate.

El estado de Washington tiene leyes del Buen Samaritano para protegerlos a usted y a su amigo del enjuiciamiento por posesión de drogas.

## CÓMO USAR EL AEROSOL NASAL DE NALOXONA

Empieza por acostar a tu amigo.

### 1. Abre el empaque.

No pruebes el rociador. El cartucho contiene una sola dosis.



### 2. Sosten el cartucho de esta manera.



### 3. Inserta la boquilla en cualquiera de las fosas nasales.



Sus dedos deben tocar la nariz.

### 4. Oprime el émbolo hasta el fondo.

La naloxona comienza a actuar dentro de 2 - 3 minutos.

