



Если у вашего друга наблюдаются приведенные ниже симптомы, возможно, у него передозировка.

- Он не просыпается.
- Не дышит каждые 3–5 секунд.
- Кожа имеет синеватый, серый или фиолетовый оттенок, либо холодная на ощупь.

Если вам кажется, что у вашего друга передозировка, дайте ему налоксон (Narcan) и позвоните по номеру 911.

На территории штата Вашингтон действуют положения Good Samaritan (Закон доброго самаритянина), защищающие спасателя и пострадавшего от преследования за хранение наркотиков.

Как пользоваться налоксоном в форме для инъекций

Сначала переведите человека в положение лежа.

1. Откройте упаковку

Снимите колпачки с флакона и шприца.

2. Введите иглу во флакон

Проколите иглой резиновую пробку.

Переверните флакон вверх дном и наберите препарат в шприц.

3. Введите иглу в крупную мышцу

Если необходимо, сделайте это через одежду.

4. Введите всю дозу налоксона.

Затем сделайте искусственное дыхание. Если человек не пришел в сознание в течение 2–3 минут, дайте еще одну дозу налоксона.

Продолжайте делать искусственное дыхание и давать налоксон, пока человек не придет в сознание или пока не прибьет помощь.



Чтобы узнать больше,
посетите сайт:

WAFriendsForLife.com

Washington State
Health Care Authority