



Каждый человек
заслуживает жить,
и любой может
стать
другом на всю
жизнь.

**ПОЗАБОТЬТЕСЬ О
БЕЗОПАСНОСТИ
СВОИХ ДРУЗЕЙ.
НОСИТЕ С СОБОЙ
НАЛОКСОН
(NARCAN).**



Подробнее на сайте:
WAFriendsForLife.com

Washington State
Health Care Authority

Большинство случаев
передозировки опиоидов
со смертельным исходом в
штате Вашингтон связано со
злоупотреблением фентанилом.

Налоксон купирует эффект
от передозировки опиоидов,
включая фентанил.

ФАКТЫ О ФЕНТАНИЛЕ

**Сильнодействующий.
Непредсказуемый. Опасный.**

- Фентанил — это синтетический сильнодействующий опиоид, поэтому злоупотребление им легко приводит к передозировке.
- Вы можете непреднамеренно принять фентанил с таблетками, кокаином, МДМА или героином, куда его могли добавить.
- Одна таблетка, дорожка или доза может вызвать смертельную передозировку.

ФАКТЫ О НАЛОКСОНЕ

**Безопасный. Простой
в применении. Легальный.**

- Налоксон — лекарственный препарат, предотвращающий передозировку опиоидов.
- Любой человек может приобрести, носить с собой и применять налоксон, потому что для этого не нужно проходить специальную подготовку.
- Во многих сообществах препарат можно получить бесплатно. Кроме того, его можно купить в аптеке.
- На территории штата Вашингтон на постоянной основе действует приказ, благодаря которому вам не требуется рецепт для приобретения этого препарата.
- Налоксон не вызывает привыкания и не может навредить человеку, даже если он не принимал опиоиды.

У ВАШЕГО ДРУГА МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДОЗИРОВКА, ЕСЛИ:

- он не просыпается;
- не дышит каждые 3–5 секунд;
- кожа имеет синеватый, серый или фиолетовый оттенок, либо холодная на ощупь.

Если вам кажется, что у вашего друга передозировка, позвоните по номеру 911. Затем дайте ему налоксон и сделайте искусственное дыхание.


На территории штата Вашингтон действуют законы доброго самаритянина, защищающие спасателя и пострадавшего от преследования за хранение наркотиков.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОКСОНОМ В ФОРМЕ СПРЕЯ ДЛЯ НОСА

Сначала переведите человека в положение лежа.

1. Откройте упаковку

Не брызгайте, чтобы
проверить.
Спрей рассчитан
на одну дозу.




2. Держите баллончик вот так



3. Вставьте наконечник спрея в любую ноздрю

Ваши пальцы должны
касаться носа.



4. Нажмите на поршень до упора

Действие налоксона
начнется через
2–3 минуты.

