



Кожен заслуговує  
на життя,  
**і кожен може стати  
другом на все  
життя.**



Дізнайтеся більше на сайті  
[WAFriendsForLife.com](http://WAFriendsForLife.com)

**ЗБЕРЕЖІТЬ  
ЖИТТЯ СВОЇМ  
ДРУЗЯМ.**

**НОСІТЬ ІЗ СОБОЮ  
НАЛОКСОН  
(NARCAN).**



Більшість випадків смерті від  
передозування в штаті Вашингтон  
пов'язана зі зловживанням  
фентанілом.

Налоксон запобігає  
наслідкам передозування опіоїдів,  
зокрема фентанілу.

## ФАКТИ ПРО ФЕНТАНІЛ

**Сильнодіючий.**

**Непередбачуваний. Небезпечний.**

- Фентаніл – потужний синтетичний опіоїд швидкої дії, тож передозування настає за короткий час.
- Можна несвідомо прийняти фентаніл, доданий до таблеток, кокаїну, МДМА або героїну.
- Одна таблетка, «доріжка» або доза може призвести до смертельного передозування.

## ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАЛОКСОН

**Безпечний. Простий у використанні. Легальний.**

- Налоксон – це лікарський засіб, що запобігає наслідкам передозування опіоїдів.
- Будь-хто може придбати, носити із собою та використовувати налоксон, АДЖЕ для цього не потрібно проходити спеціальне навчання.
- У багатьох спільнотах налоксон можна отримати безкоштовно. Крім того, ви можете придбати його в аптеці.
- На території штату Вашингтон постійно діє наказ, згідно з яким налоксон можна придбати без рецепта.
- Налоксон не викликає залежність і не може зашкодити, навіть якщо людина не приймала опіоїди.

## У ВАШОГО ДРУГА МОЖЕ БУТИ ПЕРЕДОЗУВАННЯ, ЯКЩО:

- він не прокидається;
- він не робить вдихи кожні 3–5 секунд;
- колір шкіри має синюватий, сіруватий чи фіолетовий відтінок, або шкіра холодна на дотик.

Якщо ви підозрюєте, що у вашого друга передозування, телефонуйте за номером 911. Після цього дайте другові налоксон і зробіть штучне дихання.

На території штату Вашингтон діють положення Good Samaritan (Закон доброго самарянина), які захищають вас і ваших близьких від кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ НАЛОКСОНУ У ФОРМІ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ

Спочатку переведіть людину в положення лежачи.

### 1. Відкрийте упаковку

Не перевіряйте справність спрею.

Флакон містить лише одну дозу.



### 2. Утримуйте флакон ось так



### 3. Вставте насадку в будь-яку ніздрю

Ваші пальці мають торкатися носа людини.



### 4. Натисніть на поршень до кінця

Налоксон почне діяти протягом 2–3 хвилин.

